

**Sostenuti dai dati di una meta-analisi con esiti clinici positivi, iniziate a utilizzare la terapia 3M Veraflo per favorire la guarigione dei vostri pazienti e rafforzare la vostra pratica clinica.**



### Informazioni per ordinare la terapia Veraflo

Unità terapeutica 3M™ V.A.C.® Ulta™	HCULTDEV01
Medicazione 3M™ V.A.C. Veraflo™, piccola, conf. da 5	ULTVFL05SM
Medicazione 3M™ V.A.C. Veraflo™, media, conf. da 5	ULTVFL05MD
Medicazione 3M™ V.A.C. Veraflo™, grande, conf. da 5	ULTVFL05LG
Medicazione 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse™, media, conf. da 5	ULTVCL05MD
Medicazione 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™, media, conf. da 5	ULTVCC05MD
Medicazione 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™, grande, conf. da 5	ULTVCC05LG
Cassetta 3M™ V.A.C. Veralink™, conf. da 5	ULTLNK0500
Set di tubi 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™, conf. da 5	ULTDUO0500
Contenitore da 500 ml con gel da utilizzare con il sistema terapeutico 3M™ V.A.C.® Ulta, confezione da 5	M8275063/5
Contenitore da 500 ml con gel da utilizzare con il sistema terapeutico 3M™ V.A.C.® Ulta, confezione da 10	M8275063/10
Contenitore da 1.000 ml con gel da utilizzare con il sistema terapeutico 3M™ V.A.C.® Ulta, confezione da 5	M8275093/5

#### Bibliografia:

1. Gabriel A, Camardo M, O'Rourke E, Gold R, Kim PJ. Effects of Negative-Pressure Wound Therapy With Instillation versus Standard of Care in Multiple Wound Types: Systematic Literature Review and Meta-Analysis. *Plast Reconstr Surg.* 2021 Jan 1;147(1S-1):68S-76S. doi: 10.1097/PRS.0000000000007614. PMID: 33347065.
2. Camardo, Mark. "Veraflo Meta-Analysis Standardized and Non-Standardized Means.", 3M Internal Report, San Antonio, Texas, 2020.
3. Attinger C, Wolcott R. Clinically Addressing Biofilm in Chronic Wounds. *Adv Wound Care.* 2012;1(3):127-132. doi:10.1089/wound.2011.0333.
4. Kingsley A. The wound infection continuum and its application to clinical practice. *Ostomy Wound Manage* 2003;49:1-7.
5. Kim PJ, Attinger CE, Constantine T, Crist BD, Faust E, Hirche CR, et al. Negative pressure wound therapy with instillation: international consensus guidelines update. *Int Wound J.* 2020 Feb;17(1):174-186.

**3M**

3M Italia srl  
Medical Solutions Division  
Via Norberto Bobbio, 21  
20096 Pliotello (MI)

Phone 0039 02 70 351  
Web www.3Mitalia.it

**NOTA: per questi prodotti e terapie esistono specifiche indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni sulla sicurezza. Prima dell'applicazione, consultare un medico e le istruzioni per l'uso del prodotto. Questo materiale è destinato a personale sanitario.**

© 2022 3M. Tutti i diritti riservati. 3M e gli altri marchi citati sono marchi e/o marchi registrati. È vietato l'utilizzo non autorizzato. 70-2013-1008-6

**3M** | **Veraflo™**  
Therapy



**La Terapia 3M™  
Veraflo™ oggi disponibile  
anche al domicilio del  
paziente**

## I migliori risultati si ottengono con la continuità della cura: dall'ospedale al domicilio.

Una meta-analisi di 13 studi comparativi comprendenti 720 pazienti con molteplici tipi di ferite diverse ha mostrato una maggiore efficacia con l'uso della NPWTi-d rispetto al gruppo di controllo.<sup>1</sup>

Revisione sistematica e meta-analisi di studi comparativi di Allen Gabriel, MD, FACS e Paul Kim, DPM, MS nella pubblicazione Plastic and Reconstructive Surgery 2021.

**La terapia Veraflo\* (NPWTi-d) si è dimostrata significativamente più vantaggiosa rispetto alle opzioni di trattamento delle ferite tradizionali, inclusa la terapia V.A.C.® nei seguenti endpoint:**



Probabilità **2,39 volte** maggiore di chiusura delle ferite ( $p=0,01$ )<sup>1</sup>



Predisposizione alla **chiusura** in quasi **la metà del tempo** (7,88 giorni contro 14,36 giorni,  $p=0,003$ )<sup>1,2</sup>



**Riduzione della durata** della terapia di **oltre la metà** (9,88 giorni contro 21,8 giorni,  $p=0,02$ )<sup>1,2</sup>

Circa **1 sbrigliamento in meno** (1,77 sbrigliamenti contro 2,69,  $p=0,008$ )<sup>1,2</sup>



Probabilità **4,4 volte** maggiore di **riduzione della conta batterica** ( $p=0,003$ )<sup>1</sup>

**Iniziate con la terapia Veraflo per accelerare il percorso di guarigione.**<sup>1</sup>

### Dato di fatto

I dati hanno dimostrato che le ferite gestite con la terapia Veraflo hanno avuto esiti clinici positivi<sup>1</sup>

**~26% dei pazienti che richiedono sbrigliamento non sono idonei allo sbrigliamento chirurgico.\*\***

### Dato di fatto

La medicazione 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ è un'opzione avanzata per la pulizia della ferita\* in presenza di tessuto non vitale quando lo sbrigliamento chirurgico viene ritardato o non può essere eseguito

**Oltre il 90% delle ferite croniche sono contaminate da batteri e funghi.<sup>3</sup> La presenza di batteri nelle ferite può ritardarne la guarigione.<sup>4</sup>**

### Dato di fatto

È stato dimostrato che le ferite trattate con la terapia Veraflo hanno una probabilità 4,4 volte maggiore di riduzione della carica batterica ( $p=0,003$ )<sup>1</sup>

\*Nell'ambito della buona pratica clinica (ad es. antibiotici sistemici, sbrigliamento).  
\*\*In base a 20 sondaggi rivolti a medici appartenenti ad ACS, ACOS e ASPS, 2015.

## Raccomandazioni del team globale di esperti.

In base al documento di consenso sulla NPWT con instillazione del 2020 di Paul Kim, DPM, MS et al. nella pubblicazione *International Wound Journal*, la terapia Veraflo deve essere presa in considerazione all'inizio del trattamento alla luce dei dati e delle esperienze disponibili.<sup>5</sup>

### Caratteristiche delle ferite idonee:

- Ferite pulite
- Ferite adeguatamente pulite e ferite sottoposte a sbrigliamento
- Ferite con elevata carica batterica
- Ferite contaminate/infette
- Ferite con granulazione difficile

### Impostazioni della terapia:

- Tempo di NPWT: 2-3 ore
- Tempo di permanenza: 10 minuti
- Impostazione NPWT: -125 mmHg
- Soluzione: salina (o altre soluzioni compatibili)
- Medicazione: medicazione 3M™ V.A.C. Veraflo™ tranne in presenza di tessuto non vitale. Prendere in considerazione la medicazione V.A.C. Veraflo Cleanse Choice come opzione avanzata per la pulizia della ferita prima dello sbrigliamento chirurgico o nel caso in cui lo sbrigliamento venga ritardato o non possa essere eseguito

Interrompere la terapia al raggiungimento degli obiettivi clinici.

